

# 疾患別診療計画書

病名 高ビリルビン血症



| 経過<br>生後日数   | 入院日<br>日目  | 2日目<br>日目   | 退院日<br>日目   |
|--------------|--|---|---|
| 治療と検査        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光線療法を開始します</li> <li><input type="checkbox"/> ビリベット</li> <li><input type="checkbox"/> 保育器</li> <li>・採血と熱・呼吸・心拍数の測定をします</li> <li>・体重測定をします</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>治療を中止します</li> <li><input type="checkbox"/> ビリルビン値を測定します</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>※翌日のビリルビン値の増強がなければ</li> <li>3日目以降に退院可能です</li> </ul>  |
| 安静度          | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ビリベット用の洋服を着て、ビリベットに寝ます</li> <li><input type="checkbox"/> 裸になり、保育器に入ります</li> <li>・3時間毎に体位を変えていきます</li> <li>・光線の副作用を予防するため目にマスクをします</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>治療が終わったらコットで様子を見ます</li> <li>新生児用の着物を着ます</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>お母さんが退院後は、退院が決まりましたらご連絡致します。</li> <li>(退院時には赤ちゃん用の衣類をご用意ください)</li> </ul>                                       |
| 食事           | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ミルクか母乳を与えます</li> <li><input type="checkbox"/> 食間に5%砂糖水を飲ませます</li> </ul>  |   |   |
| 清潔           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・沐浴をします</li> </ul>  |   |   |
| 排泄           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙おむつを使います</li> </ul>   |   |   |
| 患者様及びご家族への説明 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医より治療および経過についてご説明致します</li> <li>・助産師・看護師が赤ちゃんの入院生活についてご説明致します</li> <li>・授乳やおむつ交換などの赤ちゃんのお世話についてお話しします</li> <li>※ご心配な点や不安なことがありましたら、ご相談ください</li> </ul>               |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>※退院後の生活についてお話しします</li> <li>哺乳量・皮膚の色(黄疸の強さ)</li> <li>便と尿の回数・活気などに注意しましょう。</li> <li>心配な時はいつでもご連絡ください。</li> </ul> |

※ビリベットは、赤ちゃんの背中から光線を当てて、黄疸を治療するコット専用の器具です