

「nab-PTX 毎週+RAM 療法」について

nab-PTX 毎週+RAM 療法は、胃癌に用いられる治療法です。nab-PTX はアルブミン懸濁型パクリタキセル、RAM はラムシルマブの略語です。アルブミン懸濁型パクリタキセルとラムシルマブの2種類の抗がん剤が使用されています。


1. 投与方法

薬剤	効能または使用目的	1日目	8日目	15日目
デキサメタゾン+クロルフェニラミン	アレルギー予防 吐き気予防	○(5分)		○(5分)
デキサメタゾン	吐き気予防		○(5分)	
ラムシルマブ	抗がん剤	○(60分)		○(60分)
生理食塩液	点滴ルートの洗浄	○(5分)		○(5分)
アルブミン懸濁型パクリタキセル	抗がん剤	○(15分)	○(15分)	○(15分)
生理食塩液	点滴ルートの洗浄	○(5分)	○(5分)	○(5分)

2. スケジュール

nab-PTX 毎週+RAM 療法は28日サイクルで抗がん剤を投与していきます。初日、8日目、15日目に抗がん剤を投与すると残りの13日間は「休薬期間」といい、体調の回復を待ちます。その後同様にして治療が進んでいきます。

	1サイクル目					
	1日目	2日目~7日目	8日目	9日目~14日目	15日目	16日目~28日目
投与日	○		○		○	
休薬日		○		○		○



3. 特徴

●ラムシルマブ

作用: がん細胞への血管新生を抑制することで、酸素や栄養を届かなくする作用と、他の抗がん剤をがん細胞へ届きやすくする作用があります。


注意事項: 点滴中に痛みや違和感を感じたらお知らせください。

●アルブミン懸濁型パクリタキセル

作用: がん細胞が分裂する過程で作用し、抗がん作用を示します。

注意事項: 点滴中に痛みや違和感がある場合はお知らせください。

アルブミン懸濁型パクリタキセルに使用しているアルブミンは人の血液を原料としているので、ウイルスや細菌による感染を取り除くために、血液を採取する段階から問診や検査を行い、製造過程では加熱処理し、製造後にはウイルス検査を行うなど安全対策を実施しています。



4. 副作用

抗がん剤治療によって起こりうる主な副作用の種類、予防法、そしてそれが出現したときのひとまずの対応方法を知ることが副作用対策の第一歩です。ここでは比較的高頻度に出現する副作用と頻度は少なくとも注意が必要な副作用(有害作用)について掲載しました。

(ただし、頻度や強さには個人差があることをご理解の上で、参考にさせていただきたいと思います。)

脱毛

好発時期: 2~3週間過ぎ頃から起こりやすくなりますが、治療終了後2~3ヶ月で回復し始めます。

対策: 症状が現れたら、回復まではスカーフ、かつらなどを着用していただくとよいでしょう。

外出時は直射日光を避けていただくため帽子をかぶるとよいでしょう。

頭皮を清潔に保っていただくことをお勧めします。ただし、刺激の強いシャンプー等は避けてください。



白血球減少

白血球は体の外から侵入してきた細菌等に対して体を守ってくれる(免疫反応)役割があります。白血球が少なくなると細菌等による感染が起こりやすくなり、感染すると発熱や倦怠感などの自覚症状が現れてきます。場合によっては入院治療が必要な場合もあります。

好発時期: 抗がん剤を投与後14~21日目くらいに減少のピークを迎え、28日目くらいには回復します。

対策: 細菌は手を介して口から入ってくるケースも少なくありません。**手洗い、うがい**を心がけましょう。

外出時は**マスク**を着用してください。

虫歯が原因になることもあります。虫歯のある方は抗がん剤治療を行う前に治療をしておくことをお勧めします。

好発時期に38℃以上の発熱があった場合はご連絡ください。

しびれ(末梢神経障害)

末梢神経障害は抗がん剤が知覚神経や運動神経を障害することで発症します。症状は手、足先から出てくることが多く、しびれ、感覚麻痺などが初期症状として出てきます。症状が進行すると筋肉に力が入りにくくなり、つまずきや転倒の原因にもなります。ほとんどの場合治療が終了すれば回復してきますが、時間がかかる(数ヶ月~1年)場合もあり、症状の強さに応じてお薬を処方することもあります。

好発時期: 抗がん剤点滴終了後数日でも出ることもありますが、多くは5~6週目くらいから起こりやすくなります。

症状は軽いままで推移することもあります。徐々に強くなっていく場合もあります。

自覚症状としてはボタンがかけにくい、物を落とす、1枚膜を張ったよう、つまづきやすいなどです。

対策: 早い時期に発見した方が回復も早いので、日ごろから注意してください。

症状があるときには刺激を与えないよう心がけてください。水を使うときには手袋を使用する、など。

しびれの症状は我慢せず、しびれの強さや範囲、日常生活で困ることをお知らせください。

関節痛・筋肉痛

好発時期: 抗がん剤投与の2～3日後位に出てくる場合があります。ただし、症状は軽く数日で回復する場合があります。

症状が辛い場合はお伝えください。

対策: 患部のマッサージで血流を改善するとよくなる場合があります。

強さによって痛み止めを処方することもできますのでお伝えください。

口内炎

口の中の粘膜が抗がん剤によって直接障害されてできる場合と、抵抗力の低下に伴う口腔内細菌の増殖によっておこる場合があります。症状は口腔内の違和感、疼痛、出血、冷温水痛、発赤、腫脹、などです。

好発時期: 抗がん剤投与後、数日～14日目くらいに発症しやすくなります。

対策: 次のような状態は口内炎が発症しやすくなります。

1. 口腔衛生状態の不良

虫歯、歯周病、舌苔が多い、義歯が合っていない、歯磨きやうがいができない(できていない)、など

2. 免疫能の低下

高齢者、ステロイドの使用、糖尿病、抗がん剤治療、など

3. 栄養状態の不良

4. 口腔付近の放射線治療

5. 喫煙

口腔内血流の低下、白血球・マクロファージの機能低下、歯石の形成などが原因と考えられる。

口内炎には予防が重要です！口の中を清潔に保ってください。

1. 食後の歯磨き

歯ブラシは柔らかいものを使用して不用意に傷を作らないように心がけてください。

2. うがい

歯磨き以外でも口の中が不快な場合(乾燥、違和感、口臭、など)はその都度行うことがよいでしょう。

生理食塩液や水でうがいしていただいても十分効果がありますが、マウスウォッシュを使用する場合は低刺激性のものを選択してください。

生理食塩液

食塩: 4.5g ⇒ 小さじ(5cc)で約1杯

水を加えて500ml 起きている間2～3時間毎にうがい

3. 禁煙

口内炎が出来てしまったら、刺激物や熱いものは避けてください。

水分は刺激を与えないよう、ストローを使うとよいでしょう。

必要に応じてお薬を処方しますので口内炎が出来てしまったらご相談ください。

水疱や、白苔ができた場合は早めにご連絡ください。

疲労感・発熱

好発時期:注射後に体の疲れやだるさを感じることがあります。また、熱が出ることもありますが、多くの場合すぐに回復してきます。

対策:こまめに休息を取り、睡眠時間を確保して、身体を休ませましょう。
症状が長続きするときにはご相談ください。



吐き気・嘔吐

好発時期:治療当日から数日間
症状の出方は個人差があり、数日後から出てくる方や、
症状が7日間程度続く方もいらっしゃいます。

対策:抗がん剤による吐き気の強さに応じて事前に吐き気止めの点滴を行います。
症状にあわせて吐き気止めを処方させていただきます。上手くコントロールできない場合はお伝えください。
考えすぎるとそれだけで症状が出てくることがあります。リラックスしてあまり考えすぎないようにしてください。

食事は無理せず、食べられるものを少量取っていただいても結構です。

水分(水、スポーツドリンク、など)はなるべく取っていただいた方がよいでしょう。便秘の予防にもなります。
便秘は吐き気の原因にもなります。必要に応じて下剤を服用することをお勧めします。
部屋の空気を入れ替えたり、趣味を楽しんだりすることで吐き気が楽になることもあります。



食欲不振

好発時期:治療開始から数日～1週間程度で一時的に低下してくることがあります。

対策:**食欲がない時には無理をせず、食べられるものを可能な範囲でバランスよく食べましょう。**
症状が長続きするときはご相談ください。

下痢

好発時期:投与から数日後くらいにおこることが多いようですが、症状は軽いことが多いようです。

対策:水分を多めに取って脱水が起きないように心がけてください。

牛乳などの乳製品、コーヒー、アルコール、下剤や腸管の運動を促進する薬(メクロプラミドなど)は避けた方がよいでしょう。

頻回の水様便や発熱を伴う場合はご相談ください。



高血圧症

好発時期: 投与開始後1ヶ月程度での発症が多いようです。

対策: **自宅での定期的な血圧測定をお願いします。**

めまい、ふらつき、がまんできない頭痛と吐き気、けいれん、などの症状が出た場合はご連絡ください。

安静時にくり返しの測定をしても最大血圧が180mmHgまたは最小血圧が120mmHgを超える場合もご連絡ください。

出血傾向

好発時期: 治療期間を通して可能性があります。

対策: **粘膜からの出血**が多いようです(鼻血、歯ぐきなど)が、通常は軽く、自然にまたは圧迫することで止まります。(もし、10~15分位しても止まらない場合はご連絡ください)

傷口が治りにくくなることがありますので怪我などには注意してください。

口から血を吐いたり、下血などが見られた場合は早めにご連絡ください。



爪への影響

好発時期: 治療開始後、数週間から数ヶ月の間に爪が変色したり、剥がれやすくなったりすることがあります。

対策: 一時的な場合が多く、注射が終了すれば次第に回復してきます。

爪は適度に切りそろえ清潔に保ちましょう。

痛みを伴ったり、出血や膿(うみ)が出るような場合はご相談ください。



間質性肺炎

間質性肺炎は、肺が炎症を起こし機能が低下する病気です。確率は低いですが、放置すると重篤化する危険性があります。症状としては**息切れ、呼吸困難、空咳、発熱**などが起こります。また、この症状は肺に病気を持っている患者さんほど起きやすいことが分かっています。上記の症状が出た場合は自己判断せずに早めにご相談ください。

対策: **初期症状は風邪によく似ているため自己判断せずに早めにご相談ください。**



アレルギー

好発時期: 点滴中または点滴後の比較的早い時点で現れることがあります。

自覚症状は、息苦しい、顔がほてる、胸が痛い、発疹がでる、汗がでる、などです。

対策: 異常を感じたらすぐにスタッフにお知らせください。

注射時反応(Infusion reaction)

好発時期:ラムシルマブの注射によって起こる可能性のある症状です。

主な症状は発熱、悪寒(さむけ)などです。まれに頭痛や倦怠感などが起こることがあります。

予防としてラムシルマブの投与前に抗ヒスタミン剤とステロイドを投与します。

ラムシルマブの投与終了後、症状が出ないか観察時間をとらせていただきます。2サイクル目以降は起こりにくくなるため観察時間は省くことができます。

異常を感じたらスタッフにお知らせください。

血管外漏出

抗がん剤を点滴しているときに血管の外に薬が漏れてしまう(漏出)ことがまれにあります。症状としては点滴部位の違和感、痛み、腫れなどで、場合によっては血管に沿って症状が出てくることがあります。もし、症状にお気づきになった場合は早めにスタッフにお声掛けください。

好発時期:点滴している間がほとんどですが、帰宅後にも異常を感じたら早めにご連絡ください。

対策:抗がん剤の種類によって対策が異なります。基本的には患部を温めたり、軟膏や注射による治療を行います。

※この他にも日常と違った症状がでた場合は病院までご連絡ください。

済生会宇都宮病院

代表:TEL 028-626-5500