

疾患別診療計画書

治療: 未破裂動脈瘤クリッピング術を受ける方へ



経過	入院・手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3~4日目	治療後5日目	治療後6~8日目(退院)
内服薬	内服薬をお預かりし、継続するか主治医に確認し御説明します。			主治医の指示にて内服薬が再開となります。				
検査				朝採血をします。午前中に頭部のCT・胸部レントゲンを撮影します。		午前中に頭部のCTを撮影します。	朝に採血をします。	
処置	手術部にマーキングを行います。血栓予防のための弾性ストッキングの測定をします。	出棟前に弾性ストッキングを着用します。	心電図のモニター、フットポンプを装着します。	医師が手術した部位の消毒を行います。CTの結果を確認後に頭部の管を抜きます。			抜糸または抜鉤があります。	
注射・点滴			術後は点滴をします。			主治医の指示があれば点滴が終了となります。		
食事	主治医の指示で治療食となる場合があります。21時より禁食となります。0時より禁飲食となります。	禁飲食です。 		頭部CT後、主治医の指示にて昼食から食事が開始されます。				
安静	手術前まで制限はありません。		ベッド上安静です。	頭部CT後、状態に合わせて病棟内の歩行が可能になります。	病院内自由です。			
排泄			手術後は尿の管が入ってきます。排便はベッド上になります。	歩行が可能になったら尿の管を抜きます。	制限はありません。 			
清潔	パジャマに着替えます、			体拭きのお手伝いをさせていただきます。		シャワー浴が可能です。	入浴が可能です。	
説明	看護師から入院生活についての説明があります。	御家族の方は手術中は病院内でお待ち下さい。終了後主治医から説明があります。				看護師から生活指導があります。栄養指導があります。		