



疾患別診療計画書

()にて右 / 左 硝子体の手術を受けられる方へ (全身麻酔)

項目	入院・術前日	手術日	術後1日	術後2日～	退院日		
準備するもの	書類	<ul style="list-style-type: none"> 手術同意書に署名し、看護師に渡してください。 麻酔科問診票を記入し、看護師にお渡しください。 				退院時に退院証明書をお渡ししますので、お部屋でお待ちください。	
	物品	<ul style="list-style-type: none"> カップ1個とテープまたは眼保護用メガネ、ウェットティッシュ (アルコールのっていないもの) を準備してください。(売店でも購入できます) 					
治療	手術診察	<ul style="list-style-type: none"> 入院時にネームバンドを右手首に付けていただきます。 診察のために瞳を開く目薬をつけます。 麻酔科の診察があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝、7階の診察室で診察があります。(お呼びします) 診察時に手術眼に印を付けます。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝、7階の診察室で診察があります。(お呼びします) 診察時にカップをご持参ください。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝、7階の診察室で診察があります。(お呼びします) 適宜外来で検査があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝、7階の診察室で診察があります。(お呼びします) 診察後はカップを外してください。 	
	清潔	<ul style="list-style-type: none"> 術後しばらくは、ご自身で洗髪できないので、洗髪しておいてください。 シャワー浴をしてください。マニキュア、化粧を落としてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術のため入浴できません。おしろいを含む化粧品はしないでください。 朝のうちに洗顔、髭剃りを済ませておいてください。術後しばらく洗顔できません。 	<ul style="list-style-type: none"> 指示まで顔を濡らさないようにご注意ください。 ※安静度表参照 	<ul style="list-style-type: none"> 指示まで顔を濡らさないようにご注意ください。 ※安静度表参照 		
	薬剤	<ul style="list-style-type: none"> 内服は医師の指示に従ってください。 薬剤にアレルギーのある方は、入院時に看護師にお知らせください。 手術する眼に感染予防のために、朝、夕、寝る前にレボフロキサシン点眼液を付けていただきます。 インスリンを注射している方は、医師の指示に従ってください。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝の検温時に瞳孔を開く目薬をします。 手術のために () 時から30分ごとに目薬をします。 禁飲食なので内服はしないでください。 術後飲水が始まったら内服を再開します。 手術に行く時間に合わせて点滴を行います。 点滴は手術後3時間後、飲水ができることを確認し終了します。 消炎鎮痛剤、胃薬が処方になります。手術後より毎食後、3日間の内服となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 1日4回 (朝・昼・夕・寝る前) 目薬をつけます。 消炎鎮痛剤、胃薬を毎食後にお渡しします。 抗生剤の点滴を2回します。 入院中に薬剤師から薬剤指導があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 1日4回 (朝・昼・夕・寝る前) 目薬をつけていただきます。 消炎鎮痛剤、胃薬を毎食後にお飲みください。 抗生剤の点滴を2回します。 3日目より抗生剤 (3日分) が処方になります。毎食後内服してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝目薬をつけていただきます。 点眼薬をお渡しします。 入院中の持参薬を看護師が管理されていた方は、薬をお返しいたします。 	
	処置		<ul style="list-style-type: none"> 帰室後3時間酸素吸入をします。 糖尿病の方は、食前に血糖を測ります。 				
	安静	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後6時間はベッド上安静です。麻酔が覚めたことを確認してから看護師と一緒に歩行します。その間の排泄はベッド上です。 手術後は診察により安静度指示が変更になります。安静度表をご参照ください。 	<ul style="list-style-type: none"> 診察、点眼時以外は、カップをつけていただきます。歩行の際は転倒等に注意してください。 ※安静度表参照 	<ul style="list-style-type: none"> 診察、点眼時以外は、カップをつけていただきます。歩行の際は転倒等に注意してください。 ※安静度表参照 	制限はありませんが、歩行の際は転倒等に注意してください。	
	食事	<ul style="list-style-type: none"> 昼食よりお食事が出ます。 食事療法中の方、食事に関してご希望のある方はお知らせください。 21時より禁食になります。 	<ul style="list-style-type: none"> 3時から禁飲食となります。手術終了後3時間後に、むせりがないことを確認し飲水と食事が再開されます。 				朝食まではお食事が出ます。
看護	<ul style="list-style-type: none"> 看護師が入院生活、手術に関する説明をします。 内服薬、点眼薬、術後の安静度に関する説明をします。【眼科安静度表】をお渡しします。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術室に行く前に、入れ歯、補聴器、指輪、時計、眼鏡等は外してください。 手術中に変更があった場合は、改めて説明させていただきます。 予定通りの場合は、特に医師からの説明はありません。 疑問やご不明な点がありましたら、看護師までお知らせください。 				<ul style="list-style-type: none"> ご自分で点眼が難しい方は、ご家族にも説明いたします。 退院時に点眼薬を受け取ったかご確認ください。 ネームバンドを外してから退院となります。 	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 入院時にご持参いただいたお薬 (内服薬・点眼薬・インスリンなど) を確認します。 				パンフレット【眼科手術を受けた方へ】をお渡しします。ご参照ください。		

《退院について》

- 次回外来までは、夜お休み前に必ずカップまたは保護用メガネをつけましょう。
 - 次のような症状があった場合、早めに外来受診しましょう。(予定日以外でも受診できます)
- 急に視力が低下したと感じたとき / 眼の痛みが発生したとき / 充血・めやにが多くなったとき / 見える範囲が狭くなったとき / 虫が飛んでいるように見えたり、糸くずやゴミのようなものが見えるとき
光がないのに光を感じる時 / 強く目をぶついたり圧迫したとき
- 目薬・日常生活について **【眼科手術を受けた方へ】** のパンフレットをご参照ください。