

疾患別診療計画書

急性感音性難聴（突発性難聴）にて安静・点滴療法を受ける方へ



	治療開始日	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	退院予定
治療検査	<p>約2時間かけて1日1回、副腎皮質ホルモン剤入りの点滴をします。</p> <p>聴力検査を週3回行い経過を観察していきます。</p>							
食事	特に制限はありません。							
安静	<p>安静が必要です。なるべくベッドの上で過ごしましょう。 雑誌、新聞は疲れない程度にお読みください。 入院中、テレビ・ラジオは健康な方の耳にイヤホンをつけてご利用ください。</p>							
清潔	シャワー、洗髪の希望のある時は、お知らせください。							
説明	<ul style="list-style-type: none"> 病棟の構造、日課についてご説明します。 病気の原因については完全には解明されていません。 ウイルスによる血流障害、神経細胞の障害による症状と考えられています。 血流改善、傷害された神経細胞を回復させる作用のある副腎皮質ホルモン剤を点滴します。 副作用⇒血圧上昇、高血糖、胃潰瘍などがあります。 (薬剤については薬剤師より説明があります。) 						<p>【退院後の留意点】</p> <ul style="list-style-type: none"> 安静も大切です。 無理をしないようにしましょう。 定期受診を忘れないで下さい。 気になる症状があれば早めに受診して下さい。 	