

## 疾患別診療計画書

食道がんの化学療法を受ける方へ



経過	入院日・治療前日	治療1日目	治療2日目	治療3日目	治療4日目	治療5日目	治療6日目～退院前日	退院当日
治療処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>入院後のネームバンドを装着します。</li> <li>入院後に点滴を開始します初日は抗がん剤は入りません。</li> </ul>	3種類の吐き気止め(アロキシン・プロイメド・デカドロン)を投与後に、3種類の抗がん剤(ドセタキセル・シスプラチン・5-FU)が入ります。	1種類の抗がん剤(5-FU)と、1種類の吐き気止め(デカドロン)が入ります。		<ul style="list-style-type: none"> <li>1種類の抗がん剤(5-FU)と、1種類の吐き気止め(デカドロン)が入ります。</li> <li>本日分で終了です。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>白血球が減少している時は、白血球を増やす注射をします。その際、感染しやすい状態になるため、マスクをしていただきます。また個室に移動することもあります。</li> <li>発熱時は抗生剤を点滴します。</li> <li>吐き気、嘔吐があれば、吐き気止めを使用しますので医師、看護師にお知らせ下さい。</li> </ul>	
検査		治療開始日より尿量の測定を行います血液検査を週に2～3回行います。						
食事	特に制限はありません・副作用として吐き気が強くなる場合がありますので、その際は無理をせず食べられるものを摂取して下さい。栄養剤(エレンタール)を1日1本内服して下さい。						白血球が低下している時は、医師の指示があるまで生ものは食べられません。	
安静	特に制限はありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滴投与中は、病棟内での歩行をお願いします</li> <li>点滴している間、点滴刺入部位に異常が無いか、確認のために頻回に伺います。</li> <li>点滴刺入部位に痛みを感じた時には、すぐにお知らせ下さい。</li> <li>白血球低下時は人混みを避けて下さい。また、感染予防のためにマスクを着用して下さい。</li> </ul>						
清潔	入浴することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>入浴することができません。身体をお拭きします。看護師にお知らせ下さい。</li> <li>歯磨きを1日3回実施して下さい。うがいも適宜して下さい。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>白血球減少や発熱が無ければ、入浴することができます。</li> <li>手洗い、うがいを実施して下さい。</li> <li>歯磨きを1日3回実施して下さい。</li> </ul>	
排泄	医師の指示にて尿量測定して下さい。	1日の尿量を測定します。用紙をお渡しますので、排尿回数・排尿量を記載して下さい。						特に制限はありません。
退院後の治療計画・療養上の注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>38.0℃以上の発熱が続く際は、受診して下さい。</li> <li>食事や薬剤等のアレルギーがある方は、看護師にお知らせ下さい。</li> <li>化学療法の同意書は、無くさずに保管して下さい。</li> </ul>							